

Krční lymfadenopatie jako první projev metastatického kolorektálního karcinomu - kazuistika

Bortlík M.¹, Mamiňák K.¹, Nováková M.², Astl J.¹

¹Klinika Otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN; ²Oddělení patologie ÚVN


Úvod

- **Krční lymfadenopatie** je častý, ale nespecifický příznak mnoha onemocnění.
- Mezi nejčastější maligní etiologie patří lymfomy či metastázy
- Metastatické postižení krčních uzlin se řídí anatomickým uspořádáním lymfatické drenáže.
- Především do supraklavikulárních regií mohou metastazovat i infraklavikulární nádory, například horního GIT nebo prsu cestou *ductus thoracicus*.


Kazuistika

- Pacientka, 47 let, s 6 týdnů trvající neboleštivou krční lymfadenopatií, odeslána na ORL kliniku ÚVN k biopsii krční uzliny
- Před náštěvou již proběhlo **UZ krku a břicha, CT plic**: bilaterální krční lymfadenopatie, mesenteriální a retroperitoneální lymfadenopatie, rozsáhlá masa v mediastinu a oboustranná hilová lymfadenopatie – vyslovena suspekce na lymfom
- Provedena **biopsie** z reg. Vb vlevo: nízce diferencovaný adenokarcinom, dle imunohistochemie s pravděpodobným origem v dolním GIT
- Na základě doporučení MDT provedeno celotělové **PET/CT**: oboustranná FDG avidní krční lymfadenopatie, mediastinální masa, oboustranná hilová lymfadenopatie, ložisko v S7 segmentu pravé plíce, ložisko v levé nadledvině, mesenteriální a retroperitoneální lymfadenopatie, ložisko v cékoascendens


Obrazová dokumentace



Histologický vzorek nádoru, Hematoxylin-eosin
Přítomné bunky nízce diferencovaného karcinomu s patrnou produkcí hlenu



Celotělové PET/CT s FDG kontrastní látkou
Zachycena krční lymfadenopatie, mediastinální masa, mesenteriální lymfadenopatie a primární tumor v oblasti cékoascendens



Snímek z koloskopie
Zobrazen stenozující karcinom s produkcí hlenu, neprostupný pro endoskop

- Na provedené **koloskopii** nález stenozujícího tumoru cékoascendens neprostupného pro sondu, histologicky ověřen jako primární ložisko, **gastroskopie** bez nálezů
- Pacientka absolvovala vstupní kontrolu na Onkologické klinice. Během celého vyšetřovacího procesu neudávala žádné obtíže včetně přijímání potravy, defekace či ztrátu hmotnosti
- Měsíc po biopsii umírá pacientka na metabolické jednotce jiné pražské FN

Cíl

Cílem kazuistiky je upozornit na vzácné původy krční lymfadenopatie. Zároveň byla upozorněna rodina na možnost dědičných nádorových syndromů.

Závěr

- Metastatické postižení krčních uzlin nádory z gastrointestinálního traktu je relativně vzácné, v naprosté většině případů se jedná o nádory horního GIT metastazující do supraklavikulárních uzlin.
- Nádor dolního GIT bez jakýchkoli příznaků, jehož jediným projevem je krční lymfadenopatie, je i ve světové literatuře naprostou vzácností.

Poděkování

Děkujeme celému týmu ORL kliniky, Onkologické kliniky, Interní kliniky a Ústavu patologie ÚVN za spolupráci při diagnostice pacientky a přípravě této práce.