

Akutní epiglottitida, zapomenutá diagnóza, či stále akutní hrozba?

Halamíčková P.¹, Kalivoda I.¹, Zogatová K.¹

¹Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.

Úvod


- závažné, potenciálně život ohrožující zánětlivé onemocnění hrtanové příklopky
- riziko obstrukce dýchacích cest až sufokace
- v minulosti typicky onemocnění dětského věku, v současnosti posun výskytu do dospělé populace

Metodika


- retrospektivní analýza pacientů na našem pracovišti v letech 2015–2025
- do souboru bylo zařazeno 57 pacientů s diagnózou akutní epiglottitidy různého stupně závažnosti
- byly vyloučeny případy otoku epiglotis v rámci jiné diagnózy
- na základě tíže klinického stavu, rozsahu otoku struktur hrtanu a míry omezení hrtanového vchodu byli pacienti rozděleni do tří skupin: incipientní, středně závažná a závažná forma

Výsledky


- incipientní forma akutní epiglottitidy byla diagnostikována u 11 pacientů
- středně závažná forma (bez výraznější obstrukce DC) se vyskytovala u 22 pacientů
- 24 pacientů bylo hospitalizováno na ARO
 - 5 pacientů bylo pouze observováno
 - u 16 pacientů bylo provedeno zajištění dýchacích cest endotracheální intubací
 - U 2 pacientů bylo nutno provést urgentní tracheotomii v lokální anestezii, v jednom případě byla provedena koniotomie
- klinické příznaky onemocnění byly velmi variabilní a neodpovídaly klasickému klinickému obrazu



počet pacientů s akutní epiglottitidou v letech 2015–2025



- Bez zajištění dýchacích cest
- Intubace
- Akutní tracheostomie
- Koniotomie



závažné epiglottitidy s nutností hospitalizace na ARO, způsob zajištění dýchacích cest

	Celkový počet (n = 57)	Incipientní epiglottitida (n = 11)	Středně závažná epiglottitida (n = 22)	Závažná epiglottitida (n = 24)
průměrný věk	51,0	49,7	49,8	52,5
ženy	19 (33,3 %)	5 (45,5 %)	6 (27,3 %)	8 (33,3 %)
muži	38 (66,7 %)	6 (54,5 %)	16 (72,7 %)	16 (66,7 %)
průměrná délka hospitalizace	8,6 dní	4,2 dní	5,7 dní	13,5 dní
kuřáci	25 (43,9 %)	2 (18,2 %)	12 (54,5 %)	11 (45,8 %)

srovnání pacientů dle tíže onemocnění

Cíl

- zhodnotit soubor pacientů s akutní epiglottitidou léčených na našem pracovišti v období 2015–2025
- posoudit klinickou prezentaci, závažnost stavu, management péče a potřebu zajištění dýchacích a způsob jejího provedení, vyhodnocení komplikací

Závěry

- akutní epiglottitida zůstává i v současnosti potenciálně život ohrožujícím stavem
- klinický obraz může být variabilní
- vyžaduje včasnou diagnostiku, správný management péče a mezioborovou spolupráci

Poděkování

Děkuji všem kolegům za odbornou spolupráci, zejména MUDr. Kalivodovi za vedení této práce.

Tato práce vznikla bez grantové podpory.



lokální fibroskopický nález v hrtanu